C^* 環の包含とガロア対応について

向原未帆

九州大学 数理学研究院

2025/9/10

$K/L (= L \subset K)$ を体の拡大とする.

ガロア群 $\text{Gal}(K/L) := \{g \in \text{Aut}(K) \mid g(l) = l, \forall l \in L\}$ を考える.

定理

K/L が “有限次ガロア拡大” であるとき, K/L の中間体全体とガロア群の部分群全体に自然な対応が存在する:

$$\{H \leq \text{Gal}(K/L)\} \ni H \mapsto K^H \in \{P \mid L \leq P \leq K\}$$

ただし, $K^H := \{k \in K \mid h(k) = k, \forall h \in H\}$.

… 体 (可換単純環) の “良い” 包含は群の作用 (対称性) で説明される.

→ Q. 作用素環 (非可換環) の場合ではどうか?

A. 良い作用素環の包含はテンソル圏の作用で理解できる.(部分因子環論)

- **作用素環とは:** 複素ヒルベルト空間上の有界線形作用素の成す $\mathbb{C}$ 代数. 関数解析的な手法で研究される. C^* 環とフォンノイマン環の二種類がある.
- **起源:**
 - 1930- フォンノイマン環論の基礎設立 (Murray-von Neumann).
 - 1940- C^* 環の表現定理が示される (Gelfand-Naimark 等)
→ C^* 環の公理系の整理.
- **研究目的:**

量子力学の数学的定式化, ユニタリ表現論の拡張, 作用素環の代数的同型類の記述及び分類, 幾何学への応用, 群や力学系の解析的性質の理解, ...

有界線形作用素

複素数体 $\mathbb{C}$ 上の完備な内積空間 $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ をヒルベルト空間とよぶ.

$$\langle \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2, \eta \rangle = \lambda_1 \langle \xi_1, \eta \rangle + \lambda_2 \langle \xi_2, \eta \rangle,$$

$$\overline{\langle \xi, \eta \rangle} = \langle \eta, \xi \rangle, \quad \|\xi\| := \langle \xi, \xi \rangle^{\frac{1}{2}} \quad \forall \xi, \eta \in \mathcal{H}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$$

線形写像 $T: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ のノルムを次で定め、有界線形作用素 ($\|T\| < \infty$) 全体の成すバナッハ環を $B(\mathcal{H})$ とかく.

$$\|T\| := \sup\{\|T\xi\| \mid \|\xi\| = 1\}$$

• $\forall T \in B(\mathcal{H})$ に対し,

$$\exists T^* \in B(\mathcal{H}) \text{ s.t. } \langle T\xi, \eta \rangle = \langle \xi, T^*\eta \rangle, \quad \forall \xi, \eta \in \mathcal{H}$$

→ $B(\mathcal{H})$ はバナッハ $*$ 環. $\|T^*T\| = \|T\|^2 = \|TT^*\|$ を満たす.

作用素環

- 作用素環... 複素ヒルベルト空間上の有界線形作用素の成す $\mathbb{C}$ 代数.
フォンノイマン環: $B(\mathcal{H})$ の作用素強位相について閉な, $*$ 部分 $\mathbb{C}$ 代数.

C^* 環: $B(\mathcal{H})$ のノルム閉な, $*$ 部分 $\mathbb{C}$ 代数.

$$\Leftrightarrow \text{バナッハ } * \text{ 環で } \|a^* a\| = \|a\|^2 = \|aa^*\|.$$

例 1 (簡単な作用素環の例)

- 行列環 $M_n(\mathbb{C})$.
- 局所コンパクトハウスドルフ空間 X 上の連続関数環 $C_0(X)$ C^* 環
- 測度空間 (X, μ) に対する $L^\infty(X) = L^1(X)^*$ フォンノイマン環

C^* 環は位相空間の非可換化, フォンノイマン環は測度空間の非可換化として考えられる.

→ 全く同じ技術は使えない...

単純 C^* 環の例

C^* 環 A であって、 0 と A 以外のノルム閉両側イデアルを持たないものを **単純 C^* 環** と呼ぶ.

例 2

行列環のテンソル積 $M_2^{\otimes n} \cong M_{2^n}$ を考える. 埋め込み

$$M_2^{\otimes n} \ni x \mapsto x \otimes 1_{M_2} \in M_2^{\otimes n+1}$$

による帰納極限 C^* 環は単純 C^* 環で **UHF 環** と呼ばれる.

例 3

以下の関係式を満たす $S_1, \dots, S_n$ からできる普遍 C^* 環は単純 C^* 環で **クンツ環 $\mathcal{O}_n$** と呼ばれる.

$$S_i^* S_i = 1, \quad \sum_{i=1}^n S_i S_i^* = 1$$

群作用と接合積環

G : 局所コンパクト群, B : C^* 環

定義 4

連続な群準同型 $G \rightarrow \text{Aut}(B)$ を G の B への作用といい, $G \curvearrowright B$ と書く.

定義 5 (接合積 C^* 環)

$\beta: \Gamma \curvearrowright B$ を離散群作用とする.

被約接合積 C^* 環 $B \rtimes_{\beta,r} \Gamma :=$ 群環 $B[\Gamma]_{\beta}$ の “適切なノルム” による完備化.

$$B[\Gamma]_{\beta} = \left\{ \sum_{i=1}^n b_i \lambda_{s_i} \mid b_i \in B, s_i \in \Gamma \right\}$$

$$\lambda_s b = \beta_s(b) \lambda_s, \quad \lambda_s \lambda_t = \lambda_{st}, \quad \lambda_s^* = \lambda_{s^{-1}} = \lambda_s^{-1}, \quad \forall s, t \in \Gamma, \forall b \in B.$$

フォンノイマン環への群作用や接合積環も同様に定義できる.

群作用と接合積環

離散群作用 $\beta: \Gamma \curvearrowright B$ から, $\mathbf{C}^*$ 環の包含 $B \subset B \rtimes \Gamma$ が得られる.
 E_β は自然な “良い” 線形射影 (条件付き期待値).

$$E_\beta: B \rtimes \Gamma \ni \sum_{s \in \Gamma} b_s \lambda_s \mapsto b_{1_\Gamma} \in B$$

例 6

群 $\mathbf{C}^*$ 環: $C_r^*(\mathbb{Z}) = \overline{\mathbb{C}[\mathbb{Z}]}$ = 自明作用 $\beta: \mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{C}$ からできる接合積
フーリエ変換 (以下) は $\mathbf{C}^*$ 環の同型 $C_r^*(\mathbb{Z}) \cong C(\mathbb{T})$ に拡張される.

$$\ell^1(\mathbb{Z}) \ni \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \delta_n \mapsto \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n \in C(\mathbb{T})$$

E_β は $C(\mathbb{T})$ 上の以下の自然な射影と同一視される.

$$C(\mathbb{T}) \ni f \mapsto \int_{\mathbb{T}} f(z) dz \in \mathbb{C}$$

コンパクト群と離散群

双対群

離散アーベル群 Γ に対し、双対群 $\hat{\Gamma} := \{g: \Gamma \rightarrow \mathbb{T} \mid \text{群準同型}\}$ はコンパクトアーベル群.

定理 7 (竹崎-高井双対定理)

(離散) アーベル群の作用 $\beta: \Gamma \curvearrowright B$ に対し、**双対作用** $\hat{\beta}: \hat{\Gamma} \curvearrowright B \rtimes_{\beta,r} \Gamma$ が存在し、

$$(B \rtimes_{\beta,r} \Gamma \rtimes_{\hat{\beta},r} \hat{\Gamma}, \hat{\beta}) \cong (B \otimes \mathbb{K}(\ell^2 \Gamma), \beta \otimes \text{Ad}\rho)$$

上記の設定で以下の包含の同型も存在する.

$$B \subset B \rtimes_{\beta,r} \Gamma \cong (B \rtimes_{\beta,r} \Gamma)^{\hat{\beta}(\hat{\Gamma})} \subset B \rtimes_{\beta,r} \Gamma$$

→ 離散群作用 $\Gamma \curvearrowright B$ から得られる包含 $\mathbf{B} \subset \mathbf{B} \rtimes \Gamma$ と
コンパクト群作用 $G \curvearrowright A$ から得られる包含 $\mathbf{A}^G \subset \mathbf{A}$ は似ている.

ガロア対応 (フォンノイマン環)

M, N : 因子環 ($M \cap M' = \mathbb{C}$ であるフォンノイマン環),
 G : コンパクト群, Γ : 離散群

定理 8 (Izumi-Longo-Popa 1998)

“極小作用” $\alpha: G \curvearrowright M$ と “外部作用” $\beta: \Gamma \curvearrowright N$ に対し, 次の全単射が存在する.
これをガロア対応と呼ぶ.

$$\{H \leq_{\text{closed}} G\} \ni H \mapsto M^H \in \{P \mid M^G \subset P \subset M\} \quad (1)$$

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto N \overline{\times} \Lambda \in \{Q \mid N \subset Q \subset N \overline{\times} \Gamma\} \quad (2)$$

… 外部性, 極小性 $\leftrightarrow$ 包含の既約性 ($M \cap M^{G'} = N \overline{\times} \Gamma \cap N' = \mathbb{C}$.)

以下に関するガロア対応も知られている.

- 因子環への Kac 型のコンパクト量子群作用 (Izumi-Longo-Popa 1998)
- 因子環へのコンパクト量子群作用 (Tomatsu, 2008)

ガロア対応 (C^* 環)

定理 9 (Izumi 2002)

単純 C^* 環への有限群の外部作用 $\alpha: \Gamma \curvearrowright A$ に対し, 以下は全単射.

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto A^\Lambda \in \{D \mid A^\Gamma \subset D \subset A\}$$

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto A \rtimes_\alpha \Lambda \in \{D \mid A \subset D \subset A \rtimes_\alpha \Gamma\}$$

定理 10 (Cameron-Smith 2017)

単位的単純 C^* 環への離散群の外部作用 $\beta: \Gamma \curvearrowright B$ に対し, 以下は全単射.

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto B \rtimes_{\beta,r} \Lambda \in \{D \mid B \subset D \subset B \rtimes_{\beta,r} \Gamma\} \quad (3)$$

定理 11 (Izumi 2024, M. 2024)

C^* 環への極小作用 $\alpha: G \curvearrowright A$ で, A^G が可分, 単純である時, 以下は全単射.

$$\{H \leq_{\text{closed}} G\} \ni H \mapsto A^H \in \{D \mid A^G \subset D \subset A\} \quad (4)$$

具体例

以下のようなコンパクト群作用に対し、ガロア対応が成立する。

例 12

- 左シフト作用 $Lt: G \curvearrowright C(G)$ が誘導する自由積 C^* 環への作用 $(Lt \otimes \text{id}) * \text{id}: G \curvearrowright (C(G) \otimes C(\mathbb{T})) * C(\mathbb{T})$.
- 単純 C^* 環へのコンパクト群の “isometrically shift-absorbing action”.
- クンツ環 $\mathcal{O}_n := C^*(\{S_i\}_{i=1}^n \mid S_i^* S_i = 1, \sum_i S_i S_i^* = 1)$ へのゲージ作用 $\gamma: \mathbb{T} \curvearrowright \mathcal{O}_n$:

$$\gamma_z(S_i) = zS_i \quad \forall i, \forall z \in \mathbb{T}.$$

… 最後の例は亜群 C^* 環の解析を使って証明できる。 (Komura 2022)

定理 13 (Gabe-Szabo 2023)

任意の “Kirchberg 環” A と局所コンパクト群 G に対し, *isometrically shift-absorbing action* $\alpha: G \curvearrowright A$ が存在する。

包含の指数

$B \subset A$ を単純 C^* 環の (単位的) な包含, $E: A \rightarrow B$ を条件付き期待値 (ノルム 1 の線形射影) とする.

- 条件付き期待値は $B - B$ 双線形写像.

$$E(b_1 a b_2) = b_1 E(a) b_2 \quad \forall a \in A, \forall b_i \in B.$$

定義 14

A の元 $\{(v_i, w_i)\}_{i=1}^n$ で, 以下を満たすものを quasi-basis と呼ぶ.

$$x = \sum_{i=1}^n v_i E(w_i x) = \sum_{i=1}^n E(x v_i) w_i, \quad \forall x \in A.$$

この時, 包含 $B \overset{E}{\subset} A$ は有限な綿谷指数 $\text{Ind}_w E = \sum_{i=1}^n v_i w_i$ を持つ.

... 上の仮定の下, $\text{Ind}_w E$ はスカラーで, quasi-basis によらない.

有限指数の包含

- 綿谷指数は部分因子環論で使われる“Jones 指数”の C^* 環類似である。
- $\text{Ind}_w E$ は A の B 双加群としての“大きさ”の情報を持っている。

例 15

有限群作用 $\alpha: \Gamma \curvearrowright A$ に対し、 $A \overset{E_\alpha}{\subset} A \rtimes_\alpha \Gamma$ は quasi-basis $\{(\lambda_s, \lambda_s^*)\}_{s \in \Gamma}$ を持つ。
... $\text{Ind}_w E_\alpha = |\Gamma|$

定理 16 (Izumi 2002)

$B \overset{E}{\subset} A$ を単純 C^* 環の有限指数を持つ包含とする。

中間環 $B \subset D \subset A$ に対し、条件付き期待値 $E_D: A \rightarrow D$ が存在する

有限群作用に関するガロア対応

A : 単純 C^* 環, $\alpha: \Gamma \curvearrowright A$: 有限群の外部作用, $A \subset D \subset A \rtimes \Gamma$: 中間環

claim 1 $A \rtimes \Gamma$ は単純 C^* 環で $A \subset A \rtimes \Gamma$ は既約 ($A \rtimes \Gamma \cap A' = \mathbb{C}$).

claim 2 前定理の条件付き期待値 $E_D: A \rtimes \Gamma \rightarrow D$ について, 以下を得る:

$$E_D(\lambda_s) \lambda_s^* \in A \rtimes \Gamma \cap A' = \mathbb{C} \quad \xrightarrow{\text{つまり}} \quad E_D(\lambda_s) \in D \cap \mathbb{C} \lambda_s, \forall s \in \Gamma.$$

claim 3 部分群 $\Lambda := \{s \in \Gamma \mid \lambda_s \in D\}$ に対し, 以下が成立.

$$E_D(\lambda_s) = \begin{cases} \lambda_s & : s \in \Lambda \text{ の時,} \\ 0 & : s \notin \Lambda \text{ の時.} \end{cases}$$

claim 4 $D = E_D(A \rtimes \Gamma) = A \rtimes \Lambda$ を得る.

定理 (Izumi, 2002)

以下は全単射:

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto A \rtimes_{\alpha, r} \Lambda \in \{D \mid A \subset D \subset A \rtimes_{\alpha, r} \Gamma\}$$

包含の離散性

$B \overset{E}{\subset} A$ を単純 C^* 環の既約 ($M(A) \cap B' = \mathbb{C}$) な包含とする.

離散的包含

包含 $B \subset A$ が “離散的” であるとき, A は B 双加群としての既約分解

$$A \cong \overline{\bigoplus_s X_s \otimes \mathbb{A}(s)}$$

を持つ. 各既約 B 双加群 X_s は有限指数を持ち, 重複度 $\dim \mathbb{A}(s)$ は有限.

例 17

$\beta: \Gamma \curvearrowright B$ を離散群作用, $\alpha: G \curvearrowright A$ をコンパクト群作用とする. 適切な仮定 (単純性, 外部性, 極小性)のもと,

$$A^G \subset A, \quad B \subset B \rtimes \Gamma \quad \text{は離散的.}$$

離散的包含とガロア対応

$B \overset{E}{\subset} A$ を単純 C^* 環の既約 ($M(A) \cap B' = \mathbb{C}$) な包含とする.

問

$B \subset A$ が離散的であるとき, $B \subset D \subset A$ なら $B \subset D$ は離散的?

- フォンノイマン環の既約な包含では常に正しい. (Tomatsu 2008)
- 条件付き期待値 $E_D: A \rightarrow D$ が存在すれば, $B \subset D$ は離散的.
... $B \subset A$ が有限指数を持てば常に正しい.
- 離散群作用やコンパクト群作用から現れる包含 $B \subset B \rtimes \Gamma$, $A^G \subset A$ に対し, 上の主張が真であることとガロア対応の成立は同値.
... 単純性や外部性, 極小性の仮定のもと常に正しい. (Cameron-Smith 2017, Izumi 2024, M. 2024)
- コンパクト量子群作用から現れる C^* 環の包含では未解決.

まとめ

G : コンパクト群, Γ : 離散群, N, M : 因子環, A, B : (可分) C^* 環

定理 (Izumi-Longo-Popa 1998)

極小作用 $\alpha: G \curvearrowright M$ と外部作用 $\beta: \Gamma \curvearrowright N$ に対し, 次は全単射.

$$\{H \leq_{\text{closed}} G\} \ni H \mapsto M^H \in \{P \mid M^G \subset P \subset M\}$$

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto N \overline{\rtimes} \Lambda \in \{Q \mid N \subset Q \subset N \overline{\rtimes} \Gamma\}$$

定理 18 (Izumi 2002, Cameron-Smith 2017, Izumi 2024, M. 2024)

単純 C^* 環への外部作用 $\beta: \Gamma \curvearrowright B$ と単純な不動点環 A^G を持つ極小作用 $\alpha: G \curvearrowright A$ に対し, 次の全単射が成立する.

$$\{H \leq_{\text{closed}} G\} \ni H \mapsto A^H \in \{D \mid A^G \subset D \subset A\}$$

$$\{\Lambda \leq \Gamma\} \ni \Lambda \mapsto B \rtimes_{\beta, r} \Lambda \in \{D \mid B \subset D \subset B \rtimes_{\beta, r} \Gamma\}$$

今後の展望・課題

課題

一般に、単純 C^* 環の既約な包含 $B \overset{E}{\subset} A$ が離散的であるとき、すべての中間環を特定できるか？

定理 19 (Hernández Palomares–Nelson 2024)

単位的で離散的な包含 $B \overset{E}{\subset} A$ と中間環 $B \subset D \subset A$ に対し次が成立する。

- (1) テンソル圏の外部作用 $F: \mathcal{C} \curvearrowright B$ と “ C^* 環対象 $A \in \text{Vec } \mathcal{C}$ ” が存在し、 $A \cong B \rtimes_F A$.
- (2) $B \subset D$ が離散的. $\Leftrightarrow C^*$ 環対象 $D \leq A$ により、 $D \cong B \rtimes_F D$.

問題点

離散的包含 $B \overset{E}{\subset} A$ と中間環 $B \subset D \subset A$ に対し、 $B \overset{E|}{\subset} D$ は離散的か？

- [1] J. Cameron and R. R. Smith; *A Galois correspondence for reduced crossed products of simple C^* -algebras by discrete groups*. *Canad. J. Math.* **71**(2019), no. 5, 1103–1125.
- [2] R. Hernández Palomares and B. Nelson; *Discrete inclusions of C^* -algebras*. arXiv: 2305.05072v2.
- [3] M. Izumi, R. Longo, and S. Popa; *A Galois correspondence for compact groups of automorphisms of von Neumann algebras with a generalization to Kac algebras*. *J. Funct. Anal.* **155**(1998), no. 1, 25–63.
- [4] M. Izumi; *Inclusions of simple C^* -algebras*. *J. Reine Angew. Math.* **547** (2002), 97–138.
- [5] M. Izumi; *Minimal compact group actions on C^* -algebras with simple fixed point algebras*. preprint, arXiv:2405.03231v1
- [6] M. Mukohara; *Inclusions of simple C^* -algebras arising from compact group actions*. *J. Funct. Anal.* **288** (2025), no. 2.